



آمادگی های لازم جهت گرافی ها:

❖ (رادیوگرافی های لومبوساکرال) KUB

بیمار باید از شب قبل موارد زیر را اجرا نماید:

- ✓ شب ساعت ۶ شام سبک میل نماید؛ مثل سوپ
- ✓ ساعت ۷ شب یک شیشه روغن کرچک میل نماید و دو عدد قرص دایمتیکون بجود.
- ✓ ساعت ۸ شب دو عدد قرص دایمتیکون بجود.
- ✓ ساعت ۱۰ شب دو عدد قرص دایمتیکون بجود.
- ✓ ساعت ۶ صبح روز عکسبرداری دو عدد قرص دایمتیکون بجود.
- ✓ صبح ناشتا به رادیولوژی مراجعه نماید.
- ✓ وسایل و داروهایی که گفته شده همراه داشته باشد.

❖ (I.V.P) آمادگی جهت عکسبرداری از کلیه ها

- ✓ لازم است تست اوره - کراتینین برای بررسی عملکرد کلیه در دو هفته اخیر انجام شده باشد.
- ✓ در صورتیکه بیمار داروی متفورمین مصرف دارد، از یک روز قبل باید قطع نماید و تا دو روز بعدهم نباید مصرف نماید.

چه وسایلی همراه داشته باشید:

- | | |
|--------------------|---------------|
| ✓ آمپول ویزی پک | طبق نسخه پزشک |
| ✓ آنژیوکت صورتی | یک عدد |
| ✓ سرنگ ۶۰ سی سی | یک عدد |
| ✓ ملحفه یکبار مصرف | یک عدد |

بیمار باید از شب قبل موارد زیر را اجرا نماید:

- ✓ شام سبک میل نماید: مثل سوپ شب ساعت ۶
 - ✓ ساعت ۸ شب دوعدد قرص دایمتیکون بجود.
 - ✓ ساعت ۱۰ شب دوعدد قرص دایمتیکون بجود.
 - ✓ ساعت ۶ صبح روز عکسبرداری دوعدد قرص دایمتیکون بجود.
 - ✓ صبح ناشتا به رادیولوژی مراجعه نماید.
- وسایل و داروهایی که گفته شده همراه داشته باشد.

❖ آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن

سی تی اسکن بدون تزریق

- ✓ برای سی تی اسکن بدون تزریق آمادگی خاصی نیاز نیست.

سی تی اسکن با تزریق

- ✓ بیمار باید ۴ ساعت قبل از انجام CT SCAN - از خوردن مواد غذایی جامد اجتناب کند ، (مایعات بلامانع است).
- ✓ کنترل آزمایش BUN-Cr لازم است.
- ✓ در صورتیکه درخواست بیمار - CT SCAN شکم و لگن با کنتراست خوراکی باشد، یک و نیم ساعت قبل، بیمار موظف است در فواصل زمانی منظم، هر دقیقه یک لیوان دارو را میل کند.
- ✓ بیمار از ۱۲ ساعت قبل تا ۲۴ ساعت بعد از تزریق ماده حاجب در صورت تحمل به خوبی هیدراته شود.
- ✓ صبح ناشتا، در ساعت مقرر به رادیولوژی مراجعه نمایید.

وسایلی که باید همراه داشته باشید:

- ✓ داروی تجویز شده توسط پزشک رادیولوژیست
- ✓ اکستنشن تیوب
- ✓ برانول صورتی
- ✓ آب معدنی ۱/۵ لیتری
- ✓ سرم نرمال سالین نیم لیتری
- یک عدد
- یک عدد
- یک عدد
- یک عدد

آمادگیهای لازم جهت سونوگرافیهای داپلر عروق شکمی ، داپلر کلیه ، داپلر

عروق پورت و مزانتریک:

شب قبل یک شام سبک میل نماید و بعد از آن یک شیشه روغن کرچک به همراه قرص بیزاکودیل مصرف کرده و تا فردای آن روز به صورت ناشتا باشد. مصرف آب ایرادی ندارد.

آمادگیهای لازم جهت سونوگرافیهای شکم، کبد و صفراومجاری صفراوی

بیمار میبایست از ۸ ساعت قبل ناشتا باشد.

آمادگیهای لازم جهت سونوگرافیهای رحم و ضامئ، حاملگی زیر ۳ ماه، کلیه

و مجار ادراری، شکم و لگن

بیمار میبایست مثانه خود را با خوردن مایعات پر نماید.

اگر بیمار سوند داشته باشد، باید سوند بسته باشد.(کلمپ کردن سوند تامثانه پرشود).

تهیه شده در واحد آموزش سلامت باهمکاری بخش رادیولوژی بیمارستان افصلی پور

کرمان. پاییز ۱۴۰۳

۰۳۴۳۱۳۲۸۱۴۳

