



راهنمای آموزش خودمراقبتی به بیمار، حین ترخیص

برونکوسکوپی

مراقبت های بعد از برونکوسکوپی

- در پایان روش شما را به یک اتاق نزدیک می‌برند، جایی که می‌توانید به مدت ۶۰-۳۰ دقیقه روی صندلی راحتی بنشینید.
- ممکن است مقداری خواب آلودگی احساس شود، مگر اینکه داروی دیگری برای مقابله با آرامبخش تجویز شود.
- احساس ناراحتی جزئی در گلو معمول است.
- سپس پزشک می‌تواند برای تحویل گزارش درخواست مصاحبه کند.

بازگشت به خانه

شما باید در روز معاینه به بیمارستان همراه باشید، زیرا پس از انجام عمل به دلیل استفاده از بیهوشی سبک، قادر به رانندگی با وسایل نقلیه نخواهید بود.

به شما توصیه می‌شود که در طول روز از زور زدن خودداری کنید و توصیه می‌شود حداقل ۱ تا ۲ ساعت پس از عمل از خوردن یا آشامیدن خودداری کنید زیرا ممکن است برخی از رفلکس‌ها، از جمله بلع مختل باشد و غذا یا مایعات به طرفین بروند.

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealth

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افصلی پور کرمان. پاییز ۱۴۰۳

