



دستورالعمل خود مراقبتی تزریق ماده حاجب

سی تی اسکن همراه با تزریق ماده حاجب

در سی تی اسکن همراه با تزریق ماده حاجب، ماده ی حاجب به بیمار تزریق میشود تا در تصاویر سی تی اسکن، بافت های بدن به شکل بهتری دیده شوند. این روش برای شناسایی ضایعات در اعضای بدن، تشخیص سرطان، کمک به تشخیص عفونتها استفاده میشود.

محدودیت ها و عوارض سی تی اسکن تزریقی

احتمال واکنش های آلرژیک: تزریق ماده حاجب به بدن، میتواند باعث بروز واکنش های آلرژیک در برخی افراد شود.

محدودیت استفاده در برخی بیمارها: برخی از بیماران مانند بیماران کلیوی، بیمارانی که آسم دارند، بیمارانی که سابقه ی حساسیت به مواد کنتراست دارند ممکن است به دلیل واکنش های جانبی و خطرانی که با این روش همراه است، نتوانند از این روش برای بررسی وضعیت داخلی شکم و لگن و سایر... استفاده کنند.

مواردی که قبل از تزریق باید اطلاع داده شود:

- سابقه حساسیت به داروهای تزریقی
- نارسایی کلیه
- سابقه حساسیت فصلی یا غذایی
- سابقه بیماری دیابت و پیوند کلیه
- مصرف قرص متفورمین
- بیماری مولتیپل میلوم و فئو کروموسیتوم
- احتمال بارداری

بروز حساسیت به ماده ی حاجب

در برخی بیمارانی که زمینه ای از حساسیت به دارو یا غذای خاص دارند الزامی است که قبل از تجویز ماده حاجب داروی ضد حساسیت تجویز شود. با این اقدام می توان احتمال بروز حساسیت به ماده حاجب را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در صورتی که قبلاً تزریق ماده حاجب داشته اید و به آن حساسیت داشته اید قبل از انجام تصویر برداری و به هنگام پذیرش به کارشناسان مربوط اطلاع دهید. واکنش های حساسیتی ممکن است به شکل خفیف (سرگیجه، افت فشارخون، خارش و کهیر خفیف و سردرد) باشد یا می تواند به صورت تأخیری ایجاد شود که در این موارد ممکن است بیمار بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تجویز ماده حاجب واکنش هایی از قبیل کهیر یا قرمزی بدن شود.

واکنشهای احتمالی به تزریق داروی سی تی اسکن:

افزایش یا کاهش فشار خون

حمله ناگهانی صرع

تهوع و استفراغ و اسهال

گرم شدن بدن

کاهش ضربان قلب

شوک

تنگی نفس

سیاهی رفتن چشمها

سنکوپ

کهیر

برافروختگی

خارش بدون بثورات

سر درد متفرقه

درد پشت جناغ

تشنج

مراقبت های بعد از مصرف ماده حاجب

نوشیدن مایعات فراوان تا هرچه سریعتر ماده حاجب تزریق شده از طریق ادرار کردن از بدن دفع شود.

بیمار می تواند رژیم غذایی و دارویی خود را بدون تغییر ادامه دهد

در صورت بروز حساسیت دارویی خفیف به صورت قرمزی پوست، خارش، کهیر و ... تا ۲۴ ساعت

آینده به پزشک مراجعه شود. در صورت بروز عوارض شدید مانند تنگی نفس، تورم مخاط و ... به

اورژانس مراجعه گردد.

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضل پور کرمان.

پاییز ۱۴۰۳

۰۳۴ ۳۱۳۲۸۱۴۳