

راهنمای پرستاری آموزش خودمراقبتی به بیمار، حین بستری

تومور ویلمز

❖ رژیم غذایی و تغذیه

✓ برای کودک شما برنامه غذایی مناسب، متعادل و متنوع با هدف تأمین نیاز روزانه به انرژی و مواد مغذی توسط متخصص تغذیه تنظیم می‌گردد به گونه‌ای که در آن از تمام گروه‌های اصلی غذایی در وعده‌ها استفاده شود.

✓ جهت پیشگیری از کاهش وزن و لاغری مفرط مخصوصاً در کسانی که با مشکل بی‌اشتهایی روبرو هستند بهتر است تعداد وعده‌های غذایی به 6تا8وعده در روز افزایش یابدو در هر وعده، در حجم کم از غذاهای مقوی و مغذی استفاده شود.

✓ برای افزایش انرژی دریافتی روزانه در بیماران لاغر، می‌توانید از مقدار متعادلی مواد غذایی پرکالری مثل کره، خامه، ماست و شیر پرچرب، انواع روغن‌های مایع مناسب (روغن زیتون، کانولا، آفتابگردان و...)، مغزها و دانه‌ها (پسته، بادام، گردو، کنجدو...) در وعده‌های غذایی با نظرپردازش استفاده کنید.

اگر کودک تهوع و استفراغ دارد ازدادن هر نوع خوراکی خودداری کنید و به پرستار خود اطلاع دهد تا طبق نظرپردازش دارو و سرم شروع شود.

❖ فعالیت

برای خارج شدن از تخت ابتدا کودک رالبه‌ی تخت بنشانید و پاهای او را از لبه‌ی تخت آویزان کنید. در صورت نداشتن تاری دید و سرگیجه و... می‌تواند از تخت خارج شود. دقت کنید حتماً پرستار بخش را در زمان خارج کردن کودک از تخت مطلع فرمایید تا در کنار شما باشد.

❖ مراقبت

ازدستکاری سرم‌ها و رابط‌های متصل به کودک خود خودداری کنید.

داروها طبق تجویز پزشک و فواصل مشخص توسط پرستار به کودک شما داده خواهد شد.

باقیم مراقبتی در زمان انجام اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید.

در صورت مشاهده خونریزی از اندام‌های بدن و یادرا درار به پرستار خود اطلاع دهید.

در زمان خارج کردن برانول از داخل رگ محل خروج را تا چند دقیقه فشاردهید تا خونریزی نکند.

مواظب باشید در زمان خواب واستراحت، برانول یا لوله سرم از دست کودک شما خارج نشود.

ممکن است روزانه از کودک شما خونگیری شود.

ازدادن خودسرانه و بدون تجویز داروها به کودک خود خودداری کنید.

در مورد انتخاب روش‌های درمانی باپزشک مشورت نمایید.

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealth

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضلی پور کرمان. بهار 1403

034 31328143