



راهنمای پرستاری آموزش خودمراقبتی به بیمار، حین بستری

عیوب مقعد در نوزاد

❖ اقدامات قبل از عمل جراحی

✓عدم تغذیه نوزاد از طریق دهان و ناشتا کردن آن

✓برقراری راه وریدی و شروع مایعات وریدی

✓جاگذاری لوله بینی معده ای برای کاهش فشار معده

✓تزریق آنتی بیوتیک تزریقی

✓کنترل دفع و جذب مایعات

✓مشاهده 24 ساعته پرینه از نظر دفع مدفوع

✓گذاشتن سوندادراری

❖ رژیم غذایی

✓در صورت اجازه پزشک بعد از هوشیاری کامل می توانید نوزاد خود را شیر دهید.

✓در صورتی که استفراغ داشت شیردهی را متوقف و در صورت اجازه مجدد پزشک شیردهی را ادامه دهید.

❖ مراقبت

✓از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به نوزاد خودداری کنید.

✓داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای نوزاد شما اجرا خواهد شد.

- ✓ با تیم مراقبتی در زمان انجام اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید.
- ✓ در صورت مشاهده خونریزی از محل عمل جراحی و خیس شدن پانسمان و یا در ادرار به پرستار خود اطلاع دهید.
- ✓ مواظب باشید در زمان خواب و استراحت برانول یا لوله سرم از دست نوزاد شما خارج نشود.
- ✓ ممکن است روزانه از نوزاد شما خونگیری شود.
- ✓ از دادن خودسرانه داروها و بدون اجازه پزشک خودداری نمایید.
- ✓ در مورد انتخاب روش های درمانی با پزشک مشورت نمایید.
- ✓ هر ساعت دفع مدفوع نوزاد خود را بررسی نمایید.
- ✓ لوله معده نوزاد در صورت اجازه پزشک و قبل از ترخیص خارج خواهد شد.

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealth

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضل پور کرمان. بهار 1403

034 31328143