



راهنمای پرستاری آموزش خودمراقبتی به بیمار، حین بستری

مسمومیت با اپیوم در اطفال

❖ اقدامات درمانی زمان مسمومیت

✓ عدم تغذیه کودک از طریق دهان و ناشتا کردن. آن به هیچ عنوان از راه دهان به کودک چیزی داده نشود چون احتمال دارد با استفراغ کردن کودک به ریه وی برگردد و موجب خفگی وی شود.

✓ برقراری راه وریدی و شروع مایعات وریدی

✓ گرفتن نمونه خون وریدی و یا شریانی و نمونه ادرار

✓ دادن اکسیژن با ماسک و یا لوله بینی

✓ جاگذاری لوله بینی معده ای

✓ تزریق پادزهر متادون

✓ کنترل دفع و جذب مایعات

❖ رژیم غذایی

✓ در صورت اجازه پزشک بعد از هوشیاری کامل می توانید به کودک خود غذا بدهید.

✓ در صورتی که کودک استفراغ داشت تغذیه را متوقف و در صورت اجازه مجدد پزشک تغذیه را ادامه دهید.

❖ مراقبت

✓ از دستکاری سرم ها و رابط های متصل به کودک خودداری کنید.

✓ داروها طبق تجویز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار برای کودک شما اجرا خواهد شد.

- ✓ با تیم مراقبتی در زمان انجام اقدامات تشخیصی و درمانی همکاری نمایید.
- ✓ مواظب باشید در زمان خواب و استراحت برانول یا لوله سرم از دست کودک شما خارج نشود.
- ✓ ممکن است روزانه از کودک شما خونگیری شود.
- ✓ از دادن خودسرانه داروها و بدون اجازه پزشک به کودک خودداری نمایید.
- ✓ لوله معده کودک در صورت اجازه پزشک و قبل از ترخیص خارج خواهد شد.
- ✓ کودک شما حداقل تا 48 ساعت در بیمارستان بستری و از نظر تنفسی تحت نظرمی باشد.
- ✓ در صورت استفراغ و کاهش تعداد تنفس و یا کاهش سطح هوشیاری پرستار را آگاه کنید.

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealt

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضل پور کرمان. بهار 1403

034 31328143

