

راهنمای آموزش خودمراقبتی به بیمار، قبل از عمل

کورنیدل بیوپسی

بیوپسی چیست؟

به روشی که برای استخراج بافت ها یا سلول ها، مایعات یا رشد سلول ها به کار می رود بیوپسی می گویند و این نمونه ها برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه ارسال می شوند و با میکروسکوپ تجزیه تحلیل می شوند.

چگونگی انجام بیوپسی

انجام نمونه برداری به روش های مختلفی انجام می شود که بستگی به محل نمونه برداری دارد. بیوپسی انواع مختلفی دارد از جمله:

- بیوپسی سوزنی
- بیوپسی آندوسکوپی یا لاپاروسکوپی
- بیوپسی برش
- بیوپسی بعد از عمل
- بیوپسی مغز استخوان

کورنیدل بیوپسی : در این روش سوزن درشت توخالی برای بیرون کشیدن بافت بکار می رود.

آمادگی برای انجام نمونه برداری

مصرف بیشتر داروها قبل از عمل منعی ندارد. شاید پزشک بخواهد از بیمارانی که داروهای رقیق کننده خون را مصرف می کنند، مصرف آنها را موقتاً قطع کنند یا به تاخیر بیااندازند تا احتمال عوارض خونریزی ناشی از مصرف این داروها کمتر شود.

برای استفاده از مکمل های گیاهی یا داروهای آسپرین، حتماً بایستی با پزشک خود مشورت کنید.

شاید این سوال برای خانم های باردار ایجاد شود که من چگونه برای بیوپسی آماده شوم؟

خانم هایی که باردار هستند باید این موضوع را قبل از انجام بیوپسی با پزشک خود در میان بگذارند تا اقدامات احتیاطی بیشتری انجام شود چرا که انجام آزمایشات تصویربرداری که همراه با نمونه برداری انجام می شود احتمالاً برای جنین ضرر دارد، البته این امر بستگی به نوع و قسمتی از بدن که نمونه برداری در آن انجام می شود، دارد. باید حتماً در مورد تاثیر این عمل بر سلامت خود و جنین و سوالات استرس زا و نگرانی های خود با پزشک خود مشورت کنید.

برای انجام نمونه برداری نیازی به ناشتا بودن نمی باشد ولی گاهی بنا به صلاحدید پزشک امکان دارد تا 8 ساعت قبل از انجام آزمایش چیزی میل نکنید و نوشیدنی نخورید، قبل از انجام بیوپسی جواهرات خود را در بیاورید. لباس های راحت و گشادی که براحتی بتوان آن را پوشید استفاده کنید و همچنین در مواردی استفاده از روپوش بیمارستانی برای آزمایش ضرورت دارد.

برای انجام عمل بیمار به حالت افقی، دراز کشیده یا نشسته است و باید حین انجام آزمایش حرکتی نداشته باشد و ثابت بماند، زمان زیادی صرف این کار نمی شود و وقت گیر نیست. عمل سرپایی انجام می شود و معمولاً در مطب پزشک یا در بیمارستان اینکار صورت می گیرد.

ناحیه مورد نظر برای آزمایش ضد عفونی می شود و با استفاده از بی حسی، درد یا ناراحتی که از سوزن ایجاد می شود را کم می کنند.

محل مورد نظر ضد عفونی و پاکسازی می شود همچنین ممکن است یک عامل بی حسی جهت کاهش درد ناشی از گذاشتن سوزن نیز بکار رود.

در روش کورنیدل بیوپسی برشی کوچک در پوست ایجاد می شود تا مسیر ورود سوزن باز شود.

هنگامی که آزمایش انجام شد، محل نمونه برداری بانداز می شود و نمونه جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه ارسال می شود.

بعد از بیوپسی به خانه می روید؟

در صورت استفاده از بی حسی موضعی، بعد از عمل به خانه باز می گردید. اما اگر برای شما از بیهوشی عمومی استفاده کرده باشند قطعاً باید یک شب را در بیمارستان بگذرانید.

References : 1. clinicalkey 2. mayoclinic 3. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing 4. familydoctor 5. Betterhealth

تهیه شده در واحد آموزش سلامت بیمارستان افضل پور کرمان. پاییز 1403

034 31328143